

AVSER COVID 19	AVSER COVID 19
Dokumenttyp:	Rutin Smittspårning av covid-19 på kommunala korttidsboenden, LSS-boenden, personlig ass. daglig verksamhet och särskilda boenden för äldre samt vård- och omsorgstagare av hemtjänst och kommunal hemsjukvård
Dokumentet gäller för, personalkategori;	Enhetschef och sjuksköterskor på SÄBO, korttidsboenden, LSS-boenden, hemtjänst och hemsjukvård samt daglig verksamhet.
Fastställt av, befattning och namn:	Tf. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ingela Oscarsson
Fastställsedatum:	2020-06-23
Eventuellt diarienummer:	
Dokumentansvarig, befattning och namn:	Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Fallqvist
Senast uppdaterat:	2021-12-02
Uppdateras nästa gång:	vid behov

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg, version 12

Revidering i denna version

Begrepp vaccinerad beskrivs i bakgrund.

Förtydligande att provtagning av personal och brukare vid smittspårning sker två gånger, direkt och dag 5.

Personal och brukare som är identifierad som hushållskontakt ska oavsett vaccinationsstatus stanna hemma från sitt arbete och provtas.

Stycket personal exponerad som hushållskontakt eller nära kontakt utanför arbetsplats är uppdelade i två stycken.

Individuell risk och handlingsplan för brukare borttagen

Brukare identifierad som hushållskontakt eller nära kontakt ska oavsett vaccinationsstatus undvika sociala aktiviteter/ daglig verksamhet samt ha så få kontakter som möjligt.

Förtydligande att den vårdcentral som medarbetaren utfört testet på blir smittspårningsansvarig.

Covidsamordnare kan sköta kontakt med smittspårningsansvarig vårdcentral.

VGR:s Flödesschema för symptomfri personal respektive brukare exponerad för covid-19

Mindre redaktionella förändringar

1. Bakgrund

För att begränsa smitta bland de som tillhör riskgrupper för covid-19 är det viktigt att i möjligaste mån skilja på friska (och) i förhållande till misstänkt eller bekräftat smittade brukare. Smittspårning runt nya fall av covid-19 inom kommunal vård och omsorg bedöms av Folkhälsomyndigheten som angelägna åtgärder för att minska förekomst och spridning av covid-19 till riskgrupper.

Vaccinerad person avser den som erhållit 2 doser vaccin samt att två veckor passerat efter andra dosen, övriga räknas som ovaccinerade. En tredje dos räknas som en påfyllnadsdos.

2. Syfte

Syftet är att förebygga risk för smittspridning relaterat till Covid -19.

3. Personalkategori

Enhetschef och sjuksköterskor på SÄBO, korttidsboenden, LSS-boenden, personlig ass., hemtjänst och hemsjukvård samt daglig verksamhet

4. Samordningsansvarig Vårdcentral/läkare

Med samordningsansvarig vårdcentral/ läkare avses i detta dokument den funktion som i närområdesplanen har givits ansvar för smittspårning på korttidsboenden, LSS-boenden och SÄBO vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Samordningsansvarig läkare/ordinatör är patientansvarig läkare (PAL), undantaget korttidsenheten som har annan överenskommelse.

Positiva svar på prover som tagits på boende, personal samt övriga som haft kontakt med boendet, skall förmedlas till samordningsansvarig Vårdcentral/läkare som tillser att screening och smittspårning enligt denna rutin sker på ett ändamålsenligt sätt. Detta gäller oavsett var provet tagits

5. Detta gäller alltid vid smittspårning

Smittspårning innebär åtgärder för att identifiera och provta möjlig smittkälla och personer som det nya fallet kan ha exponerats för smitta.

- Smittspårning utgår alltid från bekräftade fall av covid-19 (=indexfall). Bekräftade fall är:
 - personer hos vilka SARS-CoV-2 påvisats med PCR-test
 - positivt antigen test hos person med symptom förenliga med covid-19
 - positivt antigen test hos hushållskontakt till bekräftat fall, oavsett symptom.
- Vårdcentral har huvudansvar och smittskyddsanmäler brukare och personal samt ansvarar för hushållsnära och övriga kontakter.
- Enhetschef eller utsedd administratör ansvarar för att sammanställa kontakter på arbetsplatsen. Kommunens covidsamordnare ska kontaktas vid varje ny smittspårning som startas.

- All provtagning i samband med smittspårning ordineras av samordningsansvarig vårdcentral/läkare.
- Så fort ett nytt fall av covid-19 (personal eller brukare) konstaterats ska samordningsansvarig vårdcentral/ läkare kontaktas av enhetschef eller covidsamordnare. Vårdcentral/ läkare leder sedan smittspårningsarbetet.
- Smittspårning och provtagning ska påbörjas snarast då nytt fall konstaterats.
- Smittsam fas räknas från 48 timmar före indexfallets symtomdebut. Om indexfallet är asymtomatiskt räknas smittsam fas från indexfallets provtagningsdatum.
- Provtagning sker med PCR eller antigenest. Om antigenest används ska det uppfylla av Folkhälsomyndigheten rekommenderad prestanda och avläsas av särskilt tränad personal (med särskild tränad personal avses hälso-och sjukvårdspersonal som genomfört utbildning av kommunens antigenest).
- Egenköpt antigenest, det vill säga självtest, är inte tillåtet vid smittspårning.
- Antigenest tas senast dag fem i infektionsförloppet, när virusnivåerna är som högst.
- Positivt antigenest ska verifieras med PCR. Om PCR utfaller negativt tolkas det som att personen inte har covid-19.
- Asymtomatisk person med positivt antigenest betraktas som misstänkt fall i väntan på PCR-svar. Om PCR är negativt gäller PCR.
- OBS! Person med positivt antigenest och som är hushållskontakt betraktas som ett bekräftat fall även utan PCR-test. Smittspårning startas omgående. Bekräftelse med PCR rekommenderas ändå.
- Asymtomatisk person med positivt antigenest är inte ett bekräftat fall (undantag hushållskontakt) men smittspårning startas omgående.
- De medarbetare som är identifierade i en smittspårning kan med fördel använda sig av antigenest och då testa sig inför varje arbetspass under de första sju dagarna efter index provtagningsdatum. Smittspårningsregler ska följas.
- Brukare och personal som identifieras som närkontakter inkluderas i smittspårning oavsett vaccinationsstatus.
- Smittspårning omfattar i regel personer som varit inom 2 meter i minst 15 minuter. Vid bedömning om vilka som inkluderas tas hänsyn till source control samt skyddsutrustning, se avsnitt 7 "Bedömning av nära kontakt (exponerad) vid smittspårning"
- Vaccinerade nära kontakter som inte är brukare eller personal (närstående, besökare) ska identifieras i smittspårning men undantas generellt från provtagning.
- Ett första prov tas så fort som möjligt, upprepa provtagningen av alla personer med

negativt provsvar, fem dygn efter första provtagningstillfället.

- När smittspårning leder till upptäckt av ytterligare fall startar ny smittspårning runt dessa. Vid upprepade fall kan individualiserad provtagning övervägas.
- Smittspårningsansvarig läkare erhåller vid behov stöd av respektive vårdhygienisk enhet eller smittskydd Västra Götaland.
- Smittspårningslistor för dokumentation kan erhållas från [Smittskydd Västra Götaland](#), "Instruktioner om smittspårning för behandlande läkare/ smittspårare".
- Det är viktigt att ansvarig enhetschef och sjuksköterskor samverkar i smittspårningen så att ingen person missas. När flera enhetschefer involveras är det extra viktigt med samverkan så att inrapporteringen blir korrekt.

Observera att särskilda rekommendationer gäller för personer som återkommer från utlandsvistelse, se [rekommendationer](#) från Folkhälsomyndigheten.

6. Kontakter som ska provtas

De som bedömts som nära kontakter ska provtas, se avsnitt nedan. Det gäller såväl brukare som personal, även de som inte arbetar med vård och omsorg. Vaccinerade närstående och besökare ska identifieras men undantas generellt från provtagning.

7. Bedömning av nära kontakt (exponerad) vid smittspårning

Nära kontakt definieras som sammanlagt >15 minuter inom två meter. Dessa 15 minuter kan vara utspridda på flera tillfällen över ett dygn men även kortare fysisk kontakt kan inkluderas.

Vid bedömning tas hänsyn till om personal använt sig av sourcecontrol och skyddsutrustning. Om personal har arbetat med symtom inkluderas nära kontakter även om personal använt sig av source control och skyddsutrustning.

- För personal som arbetar i enlighet med rutin och använder source control och skyddsutrustning är det främst i personalrum t.ex. vid matintag eller omklädningsrum som exponering kan uppstå. Individuell bedömning görs alltid.
- För brukare är det främst vid nära kontakter med personer som inte tillämpar source control som exponering uppstår t.ex. vistelse i gemensamhetsutrymmen eller om personal inte använder sourcecontrol och skyddsutrustning. En individuell bedömning görs.

8. Generellt kan personal exkluderas som nära kontakt vid smittspårning:

- När index är pre/asymtomatisk personal och använt sig av source control.
- När index är brukare (både pre/asymtomatisk och med symtom) och personal använt andningsskydd FFP2 och heltäckande visir.

9. Brukare bedömd som nära kontakt vid smittspårning:

En individuell bedömning görs, i regel inkluderas brukare i smittspårning när index är personal oberoende om personal använt sig av sourcecontrol enligt rutin vid vårdnära arbete inom 2 meter. Hänsyn tas till tid för exponering.

Vid behov av råd för bedömning av när personal/ brukare bedöms vara nära kontakt (exponerad), kontakta Vårdhygien eller Smittskydd Västra Götaland.

10. Handläggning av symptomfria brukare som exponerats av ett bekräftat fall:

Förhöjd skydds nivå (vaksamhet) tillämpas i 14 dagar räknas från senaste tidpunkt för möjliga smittexposition. Brukaren observeras avseende eventuella symtom.

Oavsett vaccinationsstatus bör brukare som är exponerad vistas i och äta på sitt rum och ha så få kontakter som möjligt samt avstå från sociala aktiviteter under 7 dagar (invänta provsvar). Hjälプ brukaren att mobiliseras utanför rummet under kontrollerade former (undvik nära möten). Det går utmärkt att vistas utomhus.

11. Exponerad personal

Personal som ingår i smittspårning får lov att arbeta förutsatt att de inte har symtom. Om personal får milda symtom under smittspårning får hen ändå inte återgå i tjänst efter ett negativt PCR- provsvar utan måste invänta två negativa PCR-provsvar. All personal (studenter, elever, timvikarier) som ingår i smittspårning, ska informera sin handledare/närmaste chef. Vid bisyssla ska även den chefen informeras av medarbetaren.

Alla som betraktas som exponerade i smittspårningen, det vill säga även hushållskontakter till brukare eller personal, ska erhålla skriftlig information. Se [Covid-19, information och förhållningsregler till hushållskontakter](#) från Smittskydd Västra Götaland.

Exponerade personer ska alltid få tillgång till informationsblad, se [Till dig som haft nära kontakt med person som har covid-19](#) från Smittskydd Västra Götaland.

12. Vaccinerad Personal exponerad som hushållskontakt utanför arbetsplats

Hushållskontakt anses vara en person som indexfallet har delat boende med någon gång under smittsam fas. Personer som senaste halvåret haft covid-19 undantas generellt från förhållningsregler.

Oavsett vaccinationsstatus ska personal stanna hemma från sitt arbete tills det att minst 7 dagar har passerat efter att personen i hushållet med covid-19 blev provtagen. Efter detta ska medarbetaren vara uppmärksam på symtom under ytterligare 7 dagar. Medarbetaren ska provtas på dag 5 räknat från det att personen i hushållet med covid-19 blev provtagen även vid symptomfrihet. Medarbetaren måste invänta provsvar innan återgång till arbete.

Vid smittspårning ska test alltid utföras med PCR på vårdcentral, egenköpt självtest är inte tillåtet att använda.

13. Personal exponerad som nära kontakt utanför arbetsplats

Nära kontakt anses vara en person som varit i nära kontakt med en person som har covid-19, med nära kontakt menas att man träffat en smittsam person inom 2 meters avstånd i sammanlagt 15 minuter eller mer under ett dygn.

Oavsett vaccinationsstatus ska personal vara uppmärksam på symtom på covid-19 som uppkommer 14 dagar efter senaste exponering. Medarbetaren får lov att arbeta som vanligt i väntan på provsvar.

Vid symptomfrihet ska personal testa sig **så snart som möjligt** samt en gång till **fem dagar** efter att hen senaste gången träffade personen som har covid-19. Om medarbetaren har tillgång till antigen test på sin arbetsplats får dessa användas dagligen inför arbetspass i 7

dagar.

Observera att smittspårningsregler alltid måste följas! Egenköpta självtest är inte tillåtet att använda i smittspårning.

Vid symtom ska personal oavsett vaccinationsstatus alltid stanna hemma och provta sig. Dessa personer får inte gå till arbetsplatsen för att ta antigen test utan ska alltid provtas med PCR via vårdcentral.

Smittspårningsansvarig vårdcentral/ läkare är alltid ansvarig för privata kontakter och smittspårningar

14. Yrkesverksam brukare identifierad i smittspårning

Oavsett vaccinationsstatus ska brukare som är identifierade i smittspårning stanna hemma från sitt arbete. Brukaren bör vistas i och äta på sitt rum och ha så få kontakter som möjligt samt avstå från sociala aktiviteter/ daglig verksamhet under 7 dagar (invänta provsvar). Hjälpt brukaren att mobiliseras utanför rummet under kontrollerade former (undvik nära möten). Det går utmärkt att vistas utomhus.

Asymtomatiska brukare identifierade i smittspårning ska stanna hemma från sitt arbete tills två negativa provsvar inkommit.

Asymtomatiska brukare som inte vill/kan medverka till provtagning ska stanna hemma tills: Hushållskontakt: Minst 7 dagar ska ha passerat från att personen i hushållet med covid-19 blev provtagen.

Nära kontakt: 7 dagar ska ha passerat från senaste exponering skett.

15. Ansvar för smittspårningen

På kommunalt boende:

- Så fort ett nytt fall av covid-19 (personal eller vårdtagare) konstaterats ska samordningsansvarig Vårdcentral/läkare kontaktas av enhetschefen på boendet eller av covidsamordnare. Samordningsansvarig Vårdcentral/läkare leder sedan smittspårningsarbetet.
- Personal som tagit PCR- test pga. egen sjukdom och där testet utfallit positivt för covid-19 informerar sin respektive chef om provsvaret. Enhetschefen (SOL eller HSL) kontaktar sedan covidsamordnare som tar kontakt med samordningsansvarig Vårdcentral/läkare för ställningstagande till eventuell smittspårning på boendet. Medarbetaren kontaktar själv den vårdcentral hen utfört provet på för fortsatt handläggning enligt smittskyddslagen, vilket inkluderar smittspårning utanför arbetsplatsen.
- Samordningsansvarig Vårdcentral/läkare är smittspårningsansvarig på boendet

I ordinärt boende:

- Om brukare är index är provtagande/behandlande läkare smittspårningsansvarig
- Om personal är index är grundregeln att provtagande/behandlande läkare är

smittspårningsansvarig. Om provet tagits via egentest (PCR) kommer provsvaret skickas till den vårdcentral som hen har provtagit sig på. Personalen informerar sin chef om positivt provsvar och kontaktar den vårdcentral hen tagit provet på där någon av läkarna blir smittspårningsansvarig för kontakter utanför arbetsplatsen. Enhetschef/ covidsamordnare försäkrar sig om att smittspårningsansvarig vårdcentral är informerad om att smittspårning/ identifiering av arbetsrelaterade närkontakter påbörjas.

- Ansvar för att leda och dokumentera smittspårning runt fall i ordinärt boende är den vårdcentral som ordinerat provet. Vårdcentralen är ansvarig både för smittspårning på personalens arbetsplats samt hushållskontakter och övriga kontakter.

16. Genomförande

Samordningsansvarig vårdcentral/ läkare är smittspårningsansvarig, men kan delegera arbetsuppgifter till lämpliga personer. Enhetschefer bistår med underlag för smittspårningen. Vid behov kan kommunens covidsamordnare vara behjälplig. I underlaget behöver framgå vilka som varit i nära kontakt med den sjuka personen 48 timmar innan hen fått symtom och efter symtomdebut fram till smittspårningen påbörjas. PCR-/antigenpositiv person utan symtom betraktas som smittsam från provtagningsdatum

Omfattning av provtagning av kontakter ska i normalfallet vara

- a) För brukare är det främst vid nära kontakter med personer som inte tillämpar source control som exponering uppstår t.ex. vistelse i gemensamhetsutrymmen.
- b) Personal som vårdat eller haft närkontakt med indexfallet och inte tillämpat, använt sourcecontrol och skyddsutrustning.
- c) Närstående i förekommande fall, det vill säga: de fall som har haft närkontakt med brukaren inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittkälla.
- d) Personal som inte arbetar med vård och omsorg av brukaren bör inkluderas i smittspårningen om de haft nära kontakt och inte tillämpat source control.
- e) Personer med PCR-verifierad covid-19 (senaste 6 månaderna) undantas generellt från smittspårning.

Inled smittspårning och provtagning snarast då nytt fall konstaterats (gäller både PCR- och antigen-test) Enhetschef i beredskap ska följa aktuell rutin för smittspårning under beredskap för enhetschefer, som finns tillgänglig på [Kommunportalen>Coronavirus för vård och omsorgsförvaltningen>Rutiner för vård och omsorgsförvaltningen](#)

Provtagning med PCR för smittspårning genomförs endast dagtid, vardagar. Antigen-test kan med fördel användas på arbetsplatsen för att provta asymtomatisk personal som är identifierad som nära kontakt.

17. Förhöjd skyddsnivå

Var extra noggrann med basala hygienrutiner och fysisk distansering i avvaktan på provsvar, följ rutin. Förhöjd skyddsnivå ska tillämpas hos brukare som ingår i smittspårning och dokumenteras enligt rutin i Magna Cura.

Brukare som ingår i smittspårning bör vistas i och äta på sitt rum och ha så få kontakter som möjligt samt avstå från sociala aktiviteter/ daglig verksamhet under 7 dagar (invänta provsvar). Hjälプ brukaren att mobiliseras utanför rummet under kontrollerade former (undvik nära möten). Det går utmärkt att vistas utomhus. Brukaren ska observeras avseende eventuella symtom under 14 dagar räknat från tidpunkt för senaste möjliga smittotillfälle. För mer information se Västra Götalandsregionens [rutin för Covid-19 inom särskilda boendeformer och LSS](#).

18. Arbetsfördelning

18.1. Kartläggning och information om exponering

18.1.1. Sjuksköterska – med stöd från covidsmordnare

- På boende ansvarar sjuksköterska för att lista brukare oavsett vaccinationsstatus (inklusive exponerade närstående, besökare) på enheten och fyller i uppgifter i formulär [Lista för smittspårade kontakter till fall med Covid-19](#) I ordinärt boende ansvarar enhetschef för kartläggning och information av brukare i samverkan med sjuksköterska.
- Hos brukare inskrivna i hälso- och sjukvården inhämtar sjuksköterska eller lämplig delegerad person ett samtycke av brukaren och informerar per telefon anhöriga samt eventuella besökare om pågående smittspårning.
- Lämnar ut skriftlig information "[Information till dig som haft nära kontakt med en person med Covid-19](#)".

18.1.2. Enhetschefer enligt SOL, LSS respektive HSL – med stöd från covid-smordnare

- Om smittspårning bedöms vara aktuell på arbetsplatsen ska ansvarig enhetschef eller covidsmordnare kontakta smittspårningsansvarig vårdcentral och i samverkan planeras smittspårning och provtagning.
- Enhetschef eller utsedd administratör skriver ut en "[Lista för smittspårade kontakter till fall med Covid-19](#)" och sammanställer alla exponerades personuppgifter. Det kan vara bra att skriva personal på en lista och brukare på en annan lista för att enkelt hålla isär dessa. Innan listan lämnas till vårdcentral ska alla uppgifter samlas till ett dokument.
- I ordinärt boende ansvarar enhetschef för kartläggning och information av brukare i samverkan med sjuksköterska. Sjuksköterska har huvudansvar för brukare med HSV och enhetschef för brukare ej inskrivna i HSV.
- På boende ansvarar enhetschef för personal.
- På boende är det viktigt att kartlägga personer som har gjort besök under aktuell period och därmed kan ha exponerats för smittan. Dessa personer ska få följande information "[Information till dig som haft nära kontakt med en person med Covid-19](#)". I ordinärt boende ansvarar vårdcentralen för denna kartläggning med hjälp av enhetschef/personal.
- Enhetschef som ansvarar för smittspårningen för personal ska kontakta ansvarig enhetschef för varje personalkategori som identifieras i smittspårningen. Den ansvariga enhetschefen ansvarar för en gemensam smittspårningslista över alla personalkategorier tex rehab, sjuksköterskor, servicetekniker, IT.

- För att veta vilka som besökt brukaren kan enhetschef bland annat utgå från Besökslista.
- I överenskommelse anmäls all personal som identifierats i smittspårning till kommunens egentest se: [Utlämning av egentest vid smittspårning](#). Det är enhetschefen för den berörda personalen som anmäler "sin" personal. Antigentest kan användas som komplement till egentest. Positivt antigentest ska verifieras med PCR-test.

18.1.3. Samordningsansvarig Vårdcentral/läkare

- I ordinärt boende ansvarar vårdcentralen för kartläggning av hushållsnära samt sociala kontakter eventuellt med hjälp av enhetschef/personal.
- När personal är index är grundregeln att provtagande/ behandlande läkare är smittspårningsansvarig. Den vårdcentral som medarbetaren utfört testet på blir smittspårningsansvarig.
- Informerar exponerad personal om att vara uppmärksam på symtom, om inkubationstid samt om åtgärder vid eventuella symtom.
- Lämnar ut skriftlig information om Covid-19, patientinformation och förhållningsregler som finns tillgänglig under smittskyddsblad hos [Smittskyddsläkarföreningen](#), till personen som har fått ett positivt svar.

18.2. Provtagning

18.2.1. Samordningsansvarig Vårdcentral/läkare

- Ansvarar för att det finns provtagningsmaterial tillgängligt på vårdcentralen så att sjuksköterskor från boendet har material att tillgå.
- Tillser att exponerade närstående till brukare provtas.

18.2.2. Sjuksköterska

- Remissförfarande inför provtagning enligt gällande rutin.
- Sjuksköterska administrerar provtagningen för brukare på boende samt för de som är inskrivna i hemsjukvården.

18.2.3. Enhetschef

- Informerar personal om provtagning som kan tas med antigentest alternativt egentest (PCR) på vårdcentral eller egentest som kommunen har tillgång till, se "Vägledning för egentest" som finns på [Kommunportalen>Coronavirus för vård och omsorgsförvaltningen>Övrig information](#)
- Tillser att brukare som inte har HSV blir provtagna på sin listade vårdcentral. Vid behov är enhetschef eller lämplig person behjälplig med att boka tid samt ordnar med ledsagning.
- Så snart personal får provsvar ska enhetschef meddelas och svaret skrivas in på smittspårningslista.

- Om personal verksam i ordinärt boende får positivt provsvar i smittspårningen ska den personen kontakta sin chef och den vårdcentral hen provtagit sig på skyndsamt och det startas en ny smittspårning utifrån denna personalen.
- Oavsett vaccinationsstatus ska medarbetare stanna hemma om de är identifierade som hushållsnära kontakt, vårdcentral ansvarar för att ge förhållningsregler.
- Personal identifierad som nära kontakt får oavsett vaccinationsstatus lov att arbeta i väntan på provsvar, förutsatt att de är symtomfria.

18.3. Hantering av provsvar och sammanställning av smittspårning

18.3.1. Samordningsansvarig Vårdcentral/läkare eller delegerad person

- tar del av provsvaren, informerar personer positiva för covid-19 och ger förhållningsregler enligt smittskyddsblad.
- om vårdcentralen får ett positivt svar ska samordningsansvarig vårdcentral/ läkare eller delegerad person ringa covidsamordnare 0709-12 02 51 dagtid eller till hemsjukvårdens akuttelefon kväll/helg/natt 0729-98 06 00 och meddela svar.
- följer upp alla exponerade personer och sammanställer smittspårningshandlingarna: ange antal exponerade, antal provtagna, antal som utvecklade symtom, antal som var positiva i provtagning för covid-19.
- Samtliga smittspårningshandlingar skall förvaras på samordningsansvarig vårdcentral/ läkares arbetsställe.

18.3.2. Sjuksköterska

- Sjuksköterska ansvarar för att eftersöka provsvar för de som är inskrivna i hälso- och sjukvården

18.3.3. Enhetschef

- Ansvarar för att eftersöka provsvar för brukare ej inskrivna i hälso- och sjukvården.
- Enhetschef för brukarens område är huvudansvarig för sammanställning av smittspårningslistan. När smittspårningen är avslutad för ett indexfall och alla provsvar inkommit ska listorna lämnas till Samordningsansvarig Vårdcentral/läkare.

18.4. Uppföljning och bedömning av resultat

18.4.1. Samordningsansvarig Vårdcentral/läkare

- bedömer resultatet av smittspårningen.
- tar ställning till ytterligare åtgärder, vid behov med stöd av respektive vårdhygienisk enhet eller smittskydd Västra Götaland.
- Om personal får positivt provsvar i smittspårningen ska den personen kontakta sin listade vårdcentral skyndsamt och det startas en ny smittspårning utifrån den personalen.
- För brukare boende på SÄBO är samordningsansvarig vårdcentral för boendet

huvudansvarig för alla provsvar som kommer in. Nya fall delges vårdcentralen för vidare hantering- detta gäller både brukare och personal.

- För brukare i eget boende startas en ny smittspårning igång om positivt provsvar inkommer. Brukarens listade vårdcentral är ansvarig för smittspårning.

19. Smittspårning runt brukare i ordinärt boende med hemtjänst eller kommunal hemsjukvård

Om brukare är index är provtagande/ behandlande läkare smittspårningsansvarig och smittspårning ska omfatta:

- a) personal som vårdat eller haft närkontakt med indexfallet (hänsyn tas till sourcecontrol och skyddsutrustning).
- b) övriga personer som haft närkontakt med brukaren inom inkubationstiden och därmed skulle kunna vara smittkälla

Positivt resultat hos brukare provtagen på grund av symtom

Räkna 48 timmar bakåt från personens symtomdebut.

Exempel: Svea insjuknar den 4/12 klockan 14.00, då ska EC se över personer (brukare, sjuksköterskor, vårdpersonal, rehab, nattpersonal, servicetekniker) som träffat Svea från 2/12 fram till 4/12 klockan 14:00 och bedöma vilka som är exponerade för Covid-19 och ingår i smittspårning enligt kriterier ovan, se under avsnitt 7 "Bedömning av nära kontakt (exponerad) vid smittspårning"

Positivt resultat hos brukare provtagen på grund av en smittspårning

Om indexfallet är asymtomatiskt räknas smittsam fas från indexfallets provtagningsdatum.

Exempel: Provtagningsdatumet är den 3/12 och från den dagen är det förhöjd skyddsnivå. Brukaren får ett positivt provsvar 4/12 och har inga symtom eller fått symtom vid/efter provtagning ska smittspårning avse provtagningsdagen. Enhetschef ansvarar för att kartlägga personal (sjuksköterskor, vårdpersonal, rehab, servicetekniker) som träffat Svea på provtagningsdagen 3/12 och bedöma vilka som är exponerade för Covid-19 och ingår i smittspårning enligt kriterier ovan, se under avsnitt 7 "Bedömning av nära kontakt (exponerad) vid smittspårning"

Smittspårning runt personal i ordinärt boende eller kommunal hemsjukvård

Om personal är index är grundregeln att provtagande/ behandlande läkare är smittspårningsansvarig. Den vårdcentral som medarbetaren utfört testet på blir smittspårningsansvarig. Smittspårning ska omfatta, se under avsnitt 7 "Bedömning av nära kontakt (exponerad) vid smittspårning"

- a) brukare och närkontakter till brukare som kan ha exponerats av den smittade personalen.
- b) annan personal som kan ha exponerats.
- c) anhöriga och andra närkontakter till den smittade beroende på vaccinationsstatus.

20. Smittspårningstabell

20.1. Enhetschefs ansvar

Vid positiva svar ska ny smittspårning påbörjas och covid-samordnare informeras.

	<u>Smittspårning påbörjas</u>	<u>Information</u>	<u>Dokumentation</u>	<u>Kontakt med VC</u>	<u>Provtagning</u>	<u>Provsvaret</u>
Den smittade		EC lämnar info till den smittade		Personal ska själv kontakta sin VC		
Egen personal	Kartlägger personal	Info till personal	Rapporterar till covid-samordnare	Meddelar VC som ansvarar för hushålls- och privata kontakter	Anmäler personal till egetest alt. antigenest	Personal meddelar provsvar till EC som sammanställer provsvar
Annan personal		Kontaktar andra berörda EC			Andra berörda EC anmäler sin personal till egetest alt. antigenest	Personal meddelar provsvar till EC som meddelar ansvarig EC
Besökare	Kartlägger besökare	Info till besökare			Besökare provtas av VC	
Ej inskrivna i HSV	Kartlägger brukare ev. i samarbete med ssk	Info till brukare samt till anhöriga			EC ansvarar för att brukare provtas av VC.	


20.2. Sjuksköterskans ansvar

Vid positiva svar ska ny smittspårning påbörjas och covid-samordnare informeras.

	<u>Smittspårning påbörjas</u>	<u>Information</u>	<u>Dokumentation</u>	<u>Kontakt med VC</u>	<u>Provtagning</u>	<u>Provsvaret</u>
Inskrivna brukare - Boende	Kartlägger brukare	Info till brukare	Dokumenterar förhöjd skyddsnivå		Provtar brukare	Sammanställer provsvar och lämnar till EC
Inskrivna brukare – Ordinärt boende	Kartlägger brukare i samarbete med EC	Info till brukare	Dokumenterar förhöjd skyddsnivå		Provtar brukare	Sammanställer provsvar och lämnar till EC
Anhöriga till inskrivna		Info till anhöriga och ev. besökare			Anhöriga och besökare provtas av VC	

EC=enhetschef, ssk=sjuksköterska, VC=vårdcentral, HSV=hälso- och sjukvård

Flödesguide – Symtomfri personal inom kommunal vård och omsorg exponerad för covid-19



Generellt


- Personal (hushållskontakt/ nära kontakt) med bekräftad covid-19 infektion senaste halvåret undantas generellt från smittspårning och testning.
- Vid covid-19 symtom hos personal med bekräftad covid-19 infektion senaste halvåret ska hen vara hemma tills vederbörande känner sig frisk och varit feberfri ett dygn.

¹ **Hushållskontakt:** Person som delat boende någon gång med indexfall under smittsam fas

² **Nära kontakt:** Under smittsam fas, sammanlagt vistats >15min/dygn inom två meter men även kortare fysisk kontakt kan inkluderas. Se mer under rubrik "Stöd i bedömning av vilka nära kontakter som kan exkluderas vid smittspårning"

³ Test sker med PCR alternativt antigen test av tränad personal.

Flödesguide – Symtomfri vårdtagare inom kommunal vård- och omsorg exponerad för covid-19



Generellt

- Symtomfri vårdtagare med bekräftad covid-19 infektion senaste halvåret undantas generellt från smittspårning och testning.
- Vid covid-19 symtom hos vårdtagare gäller vård som vid misstänkt fall tills medicinsk bedömning genomförts, även vid bekräftad covid-19 infektion senaste halvåret.

¹ **Hushållskontakt:** Person som delat boende någon gång med indexfall under smittsam fas

² **Nära kontakt:** Under smittsam fas, sammanlagt vistats >15 min/dygn inom två meter, men även kortare fysisk kontakt kan inkluderas. Se mer under rubrik "Stöd i bedömning av vilka nära kontakter som kan exkluderas vid smittspårning"

³ Test sker med PCR alternativt antigen test av tränad personal.